

Cas de délire après une chirurgie élektive

On associe entre l'utilisation des statines à un risque accru de délire postopératoire chez les patients âgés, comme l'ont constaté Redelmeier et ses collaborateurs au cours de leur analyse de cohorte rétrospective portant sur plus de 280 000 patients âgés ayant subi une chirurgie élektive.

Voir Recherche, page 645



Dans un commentaire connexe, Marcantonio affirme qu'il est prématuré de recommander de cesser le traitement aux statines dans cette population de patients et que d'autres recherches s'imposent avant de modifier la pratique. **Voir Commentaire, page 627**

Communauté afro-néo-écossaise

Kisely et ses collaborateurs signalent des taux de morbidité associés au diabète de type 2, aux maladies circulatoires et aux troubles psychiatriques plus élevés dans une communauté afro-néo-écossaise que dans les communautés de race blanche de la province. **Voir Recherche, page 653**

Les antécédents familiaux trigénérationnels peuvent servir d'outil simple et utile pour reconnaître les patients exposés à un risque plus élevé à l'égard de certaines maladies courantes, selon Bonham et Ramos. Ce type d'outil fournit une information plus utile à l'individualisation des soins, comparativement aux antécédents raciaux ou ethniques des patients. **Voir Commentaire, page 629**

Le diagnostic de l'angine de poitrine

Selon Zaman et ses collaborateurs, les femmes et les personnes des deux sexes originaires d'Asie du Sud qui présentent des douleurs typiques sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic d'angine de poitrine et de présenter un pronostic

clinique plus sombre que celles qui présentent des douleurs atypiques. Les différences quant à la description des symptômes ne permettent pas d'expliquer les taux moindres de coronarographie et de revascularisation chez les femmes et les patientes d'Asie du Sud. **Voir Recherche, page 659**

Quel est le nombre de sujets à traiter sur la «base des événements»?

Selon Aaron et Fergusson, cette statistique pourrait être trompeuse, puisqu'elle subit une importante influence d'une minorité de patients qui présentent des événements récurrents multiples. **Voir Analyse, page 669**

Aspect cutané en pavés

Un homme de 70 ans consulte : il est obèse, hypertendu, souffre d'insuffisance cardiaque congestive, de fièvre et de douleur au niveau des tibias. Quelle est votre opinion? **Voir Pratique, page 673**



Sarcome granulocyttaire

La biopsie d'une masse douloureuse confirme le diagnostic de sarcome granulocyttaire chez une femme de 89 ans souffrant d'anémie réfractaire. **Voir Images cliniques, page 727**

Survivance des études cliniques

Un certain nombre d'incidents, lors d'études cliniques sur de nouveaux médicaments, a récemment incité les États-Unis et la Grande-Bretagne à procéder rapidement à une réforme de leurs protocoles de surveillance. Au Canada, au contraire, on semble «en mode consultation» depuis près de deux ans. **Voir Nouvelles, page 635**